

តើជំងឺរបេងតែងតែធ្វើឱ្យខ្ញុំឈឺឬ?

ជំងឺរបេងអាចនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នក ដោយមិនធ្វើឱ្យអ្នកឈឺទេ។ ខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកមានអង្គចិត្តការពារជំងឺរបេងនេះ ដែលទប់ទល់មិនឱ្យវារីបំផ្លាញអ្នកបាន។ នេះហៅថាការឆ្លងជំងឺរបេងដែលមានលក្ខណៈសំងំ (LTBI). ជំងឺរបេងមិនបង្កឱ្យអ្នករងរបួសឥឡូវនេះទេ។ ពួកវានៅសំងំនៅស្ងៀម តែវានៅមានជីវិត។ ជំងឺរបេងសំងំនៅយូរ រហូតដល់ពេលដែលខ្លួនរបស់អ្នកអាចកំចាត់ចេញបាន។ ពេលដែលអ្នកមាន LTBI អ្នកមិនអាចចំលង ជំងឺនេះដល់អ្នកផ្សេងបានទេ។ ប្រសិនបើខ្លួនរបស់អ្នកឈប់ប្រឆាំងជំងឺនេះ ពួកវានឹងភ្ញាក់ឡើង ហើយចាប់ផ្តើមលូតលាស់។ ជំងឺនេះអាចកើតឡើងចំពោះអ្នកគ្រប់គ្នា ជាមួយនឹង LTBI គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់។ ពេលជំងឺលូតលាស់ ហើយវាលដាល គេហៅវាថា "ជំងឺសកម្ម"។ មនុស្សដែលមានជំងឺប្រភេទនេះ អាចឈឺខ្លាំង ហើយអាចឆ្លង ទៅអ្នកដទៃបាន។

តើខ្ញុំអាចការពារជំងឺនេះបានដោយរបៀបណា?

មានថ្នាំជាច្រើន ដែលអ្នកអាចលេបដើម្បីបង្ការអ្នកពីការឆ្លងជំងឺរបេងសកម្មនេះ។ Isoniazid (INH) គឺជាថ្នាំធម្មតាធ្លាប់ប្រើដើម្បីព្យាបាល LTBI។ INH អាចសំលាប់ជំងឺរបេងឱ្យនៅមួយកន្លែង មុននឹងជំងឺនេះមានឱកាសបង្កឱ្យអ្នកឈឺ។ ដោយសារជំងឺនេះវាខ្លាំង វាត្រូវឱ្យយើងលេបថ្នាំជាច្រើនខែដើម្បី សំលាប់វា។

តើខ្ញុំលេប INH ញឹកញាប់ទេ?

វានឹងមានប្រសិទ្ធភាពណាស់ប្រសិនបើអ្នកលេបវាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ហើយទៀងទាត់ពេលវេលា រហូតដល់អ្នកដែលថែសុខភាពរបស់អ្នកនិយាយថា បានហើយ។ ចូរលេប INH ដោយមិនញ្ញាំអាហារ តែប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាក្រពះ អ្នកអាចលេបវា ដោយញ្ញាំអាហារបន្តិចបន្តួចបានហើយ។

ហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវតែលេបថ្នាំប្រសិនបើខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ឈឺផង?

សំលាប់ជំងឺរបេងក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នក មុនជំងឺនេះមានឱកាសភ្ញាក់ឡើង ហើយបង្កឱ្យអ្នកឈឺ។ ចូរចងចាំថាជំងឺរបេងគឺងាយស្រួលសំលាប់ណាស់នៅពេលពួកវាកំពុងតែសំងំ។

តើខ្ញុំគួរដឹងអំពីអ្វីទៀតពីថ្នាំ LTBI?

មនុស្សជាច្រើនលេបវាជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយគ្មានបញ្ហាតែមានរឿងខ្លះដែលអ្នកគួរតែស្រាវជ្រាវប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាទាំងនេះសូមទាក់ទងទៅអ្នកផ្តល់ការ ថែរក្សាសុខភាពឱ្យ កុំរងចាំរហូតដល់ពេលដែលណាត់ជួបនោះ។

- ក្តៅខ្លួនច្រើនជាងបីថ្ងៃ
- មិនសូវឃ្លានស្រកទំងន់ឬមានអារម្មណ៍ថាឡើយហត់ដោយគ្មានហេតុផល។
- ឆ្អើមខ្លើម ក្អក ឬ រាករូស

មនុស្សខ្លះទៀតមានឆ្អើមអាហារតិចតួច ពេលដែលពួកគេចាប់ផ្តើមលេបថ្នាំ។ ប្រសិនបើបញ្ហាទាំងនេះកើតឡើងចំពោះអ្នកសូមព្យាយាមញ្ញាំអាហារតិចតួចជាមួយថ្នាំលេបវានៅពេលចូលគេង។ ប្រសិនបើអ្នកនៅតែឆ្អើមខ្លើមបន្ទាប់ពីរយៈពេលបីថ្ងៃសូមទាក់ទងទៅអ្នកថែរក្សាសុខភាពឱ្យភ្លាម។

- ឈឺចាប់ក្នុងក្រពះ ឬ ក្បាលពោះ
- ទឹកនោមពណ៌ងងឹត (ពណ៌ទឹកតែ ឬ កាហ្វេ)
- ស្បែក ឬ ភ្នែកពណ៌លឿង ស្រវាំងភ្នែក
- ស្បែកឡើងកន្ទុល ឬរមាស់
- ចាក់ស្បែកគ្រប់ពេល នៅដៃ ជើង ឬនៅជុំវិញមាត់
- ជឿរលាស់រលាស់ មិននៅស្បើម

ចំនុចសំខាន់ផ្សេងទៀត:

- ការដឹកស្រាវជ្រាវពេលដែលអ្នកលេបINH អាចធ្វើឱ្យផ្លែធុររបស់អ្នកឈឺចាប់។ កុំដឹកស្រាវជ្រាវ សុរា ឬ ស្រាចំរាញ់ រហូតទាល់តែអ្នកព្យាបាលរបេងជា ។ កុំលេបលេបថ្នាំ ដោយមិនបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយ អ្នកថែរក្សាសុខភាព។

ត្រូវតែប្រាប់អ្នកថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកលេបថ្នាំផ្សេងទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកមានផ្ទៃពោះឈប់លេបថ្នាំហើយទាក់ទងជាមួយអ្នករក្សាសុខភាព របស់អ្នកភ្លាម។

- សូមរក្សាថ្នាំនេះ និង ថ្នាំទាំងអស់ឆ្ងាយពីដៃក្មេង និង សត្វចិញ្ចឹម។

តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំមិនលេបថ្នាំនេះ?

ប្រសិនបើអ្នកមិនលេប INH ឬ ឈប់លេបថ្នាំរបស់អ្នកហ័សពេក អ្នកនឹងអាចឈឺជំងឺរបេងសកម្មនេះភ្លាម។ ករណីនេះអាចកើតឡើងគ្រប់គ្នា គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ជាមួយនឹង LTBI។ កុំបណ្តោយឱ្យករណីនេះកើតឡើងចំពោះខ្លួនអ្នក និង គ្រួសាររបស់អ្នក។ សូមទាក់ទងជាមួយអ្នកថែរក្សាសុខភាព ប្រសិនបើអ្នកមានករណីដូចខាងក្រោមនេះ:

- ក្តៅ ឬ អាទិត្យ ឬ ច្រើនជាងនេះ
- បែកញើសនៅពេលយប់
- ក្អកចេញឈាម
- ក្តៅខ្លួន

តើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណា ប្រសិនបើបានចាក់ វ៉ាក់សាំង BCG រួចហើយ?

នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដែលមានជំងឺរបេងជាលក្ខណៈធម្មតា មនុស្សជាច្រើនចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលគេហៅថា BCG ។ BCG អាចការពារក្រោម ពីជំងឺរបេងបានតែវាអាចការពារបានត្រឹមតែ ២ ឬ បី ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។

មនុស្សដែលមាន BCG អាចទទួលជំងឺរបេងសកម្មនេះបាន។ ប្រសិនបើបានចាក់វ៉ាក់សាំង BCG រួចហើយ អ្នកអាចការពារខ្លួនរបស់អ្នកដោយលេបថ្នាំចំពោះតែ LTBI ។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំពុំមានលទ្ធភាពចំណាយលើថ្នាំនោះ?

ចូរសួរវិជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ឬគិលានុបដ្ឋាយិកា អំពីការទទួលបានថ្នាំរបេង ដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ ពីសុខភាពសារណៈរដ្ឋមេន កម្មវិធីគ្រប់គ្រងជំងឺរបេង។

តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំផ្លាស់ទីលំនៅ?

ប្រសិនបើអ្នកផ្លាស់ប្តូរលំនៅទៅរដ្ឋ ឬទីក្រុងផ្សេងទៀត ចូរប្រាប់អ្នកថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នក មុនអ្នកផ្លាស់ប្តូរ។ ពួកគេអាចជួយអ្នកបានដោយធានាថា អ្នកអាចទទួលបានថ្នាំរបេងបន្ទាប់ពីអ្នកប្តូរលំនៅ។

ការពារខ្លួនរបស់អ្នក ការពារគ្រួសាររបស់អ្នក ហើយមិត្តរបស់អ្នកពីជំងឺរបេង។
ចូរលេបថ្នាំរបស់អ្នកទាំងអស់